



## La mortalité néonatale au Maroc

## Neonatal mortality in Morocco

### وفيات حديثي الولادة في المغرب

N. Lamdouar Bouazzaoui, A. Barkat

#### Définition

La mortalité néonatale englobe tous les décès survenus pendant le premier mois de vie. Elle est dite précoce lorsqu'elle survient avant la première semaine de vie et tardive si le nouveau-né décède entre 7 et 27 jours révolus.

#### Introduction

La mortalité néonatale s'avère être un véritable problème de santé publique et une préoccupation majeure des organismes nationaux et internationaux. Elle représente un indicateur du développement humain, indicateur qui permet de mesurer la place du Maroc sur l'échiquier international. Son évolution est étroitement liée aux conditions sanitaires et socio-économiques du pays.

La connaissance du niveau de la mortalité néonatale permet d'identifier les populations cibles, d'évaluer l'impact des programmes actuels de santé et de définir une stratégie appropriée. Par conséquent, elle permet d'identifier les efforts déployés par les pouvoirs publics.

#### Données marocaines

Ainsi, 57% de l'ensemble des décès infanto-juvéniles ont lieu durant le premier mois de vie, 37% parmi eux sont dus à des causes périnatales dont principalement

l'asphyxie, l'infection et le faible poids de naissance. La mortalité infanto-juvénile reste élevée au Maroc, elle s'évalue à 28 000 décès par année, dont 16 000 décès en période néonatale. Ainsi, malgré une tendance à la baisse, les chiffres concernant la mortalité maternelle, étroitement liée à la mortalité néonatale, restent élevés. Sont enregistrés 227 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes pour la période 1995-2003. Durant la même période, 63% des femmes ont accouché en milieu surveillé dont 40% en milieu rural. De même, malgré un recul de la mortalité infantile de 57‰ en 1992 à 40‰ en 2004, la mortalité néonatale résiste à la baisse. Elle n'a perdu que 4 points entre 1992 (31‰) et 2004 (27‰).

Les contraintes sont notamment liées au faible recours des femmes aux services de santé. Les facteurs en cause sont nombreux. On peut en citer les difficultés d'accessibilité aux structures de soins, l'enclavement, l'analphabétisme, la faible participation communautaire, la sous-utilisation des maternités rurales, l'insuffisance budgétaire,....

#### Réalisations

A travers la mise en œuvre de son plan stratégique 2008-2011, le ministère Marocain de la Santé vise la réduction de la mortalité maternelle à 50 décès pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2012 et celle de la mortalité infantile, y compris sa composante néonatale, à 15‰. Il a ainsi mis en

*Tiré à part : N. Lamdouar Bouazzaoui : Service de Pédiatrie Centre National de Référence en Néonatalogie et en Nutrition. Hôpital d'enfants, CHU de Rabat-Salé, Maroc.*

*E.mail : naimalamdouarbouazzaoui@hotmail.com*

place des mesures comportant : la distribution de kits pour les femmes enceintes, la sensibilisation à la nécessité de l'assistance médicale pendant l'accouchement ainsi que la gratuité de l'accouchement.

Pour 2009, le ministère de la Santé a alloué un budget de 60 millions de dirhams pour la création de services obstétricaux d'assistance médicale d'urgence et un service de néonatalogie dans chaque région. Il œuvre également pour la mise en place d'une standardisation et d'une régionalisation des soins périnataux à fin d'asseoir une véritable politique périnatale.

## Conclusion

Les principales causes des décès néonataux demeurent accessibles à la prévention. Celle-ci est basée sur un meilleur suivi des grossesses, le monitoring de l'accouchement, l'amélioration des conditions de transport avec promotion du transport in-utéro. Ceci suppose la dotation en moyen des unités de soins intensifs néonataux.